

Myringoplastik

med rispapir
("lukning af hul på trommehinde")



*Peter Tingsgaard Ph.d.
Speciallæge i øre- næse- halssygdomme
Korsgade 6,1 4200 Slagelse
Patientlf.: 5853 3854
Fax: 5850 3932
www.tingsgaard.dk*

Myringoplastik med rispapir


Hvis et hul i en trommehinde ikke vil hele af sig selv, kan en operation blive nødvendig. Er hullet forholdsvis lille kan det lappes med rispapir.

Øret skal helst være tørt før man forsøger operation.

Operationen foregår i fuld bedøvelse givet af klinikkens speciallæge i anæstesiologi.

Til operationen skal medbringes en ledsager, der sidder hos dig efter operationen og kører dig hjem.

Du må ikke køre bil lige efter operationen.



Før operationen

Af sikkerhedshensyn skal mavesækken være tom ved operationen, dvs:

Man må ikke spise de sidste 6 timer før operationstidspunktet.

Der må drikkes lidt vand indtil 2 timer før operationen.

Ammemælk må gives senest 4 timer før operation.

Astmaspray må benyttes som vanligt før operation



- Blodfortyndende medicin må ikke tages i 5 dage før operationen.
- Bruger du hjerte- eller blodtryksmedicin skal du aftale nærmere med ørelægen

Blodtryksmedicin på operationsdagen

	Styrke	Morgen
Tbl.		
Tbl.		

Operationen

Ved operationen renses hullets kant op og dækkes derefter med rispapir. Trommehinden heler derefter op i løbet af et par uger.



Efterforløbet

Efter operationen må man ikke få vand i øret de første 3 uger.

Ved øreflåd, uventede smerter eller svimmelhed efter operationen kontaktes klinikken telefonisk på tlf. 5853 3854.