

Tonsillektomi

(”total fjernelse af halsmandler”)



*Peter Tingsgaard Ph.d.
Speciallæge i øre- næse- halssygdomme
Korsgade 6, 1 4200 Slagelse
Patienttlf.: 5853 3854
Fax: 5850 3932
www.tingsgaard.dk*

Tonsillektomi.

Tonsillektomi betyder total fjernelse af halsmandlerne. Operationen kommer på tale ved gentagne halsbetændelser, meget store mandler eller mandelpropper.

Operationen foregår i fuld bedøvelse givet af klinikkens speciallæge i anæstesiologi. Ved operationen bliver mandlerne fjernet gennem munden. Munden holdes åben ved hjælp af en mundspærre, som trykker på tungen.

Til operationen skal der medbringes en ledsager, der sidder hos dig efter operationen, og senere kører dig hjem. Du må ikke køre bil lige efter operationen. Efter operationen skal du påregne 2 ugers rekreation. Senere på dagen vil du blive ringet op af ørelægen, som kontrollerer hvordan du har det.



Før operationen

Af sikkerhedshensyn skal mavesækken være tom ved operationen, dvs:

Man må ikke spise de sidste 6 timer før operationstidspunktet.

Der må drikkes lidt VAND indtil 2 timer før operationen.

Astmaspray benyttes som vanligt før operation.

Børn skal ledsages af 2 voksne.


Der skal 2 timer før operationen gives smertestillende medicin.

Smertestillende 2 timer før operation

Stikpille Panodil á	mg	stk.
Disp. tbl. Pamol Flash á	mg	stk.

Efter operationen

Du vil blive observeret i klinikken, til din tilstand er stabil. Efter operationen føles drøblen mere fyldig end normalt. (vandig hævelse) og tungen tykkere end før (efter trykket fra mundspærre).



Kommer der frisk blødning fra halsen efter operationen, er det vigtigt at man uanset tidspunktet på døgnet kontakter ørelægen (tlf. 2531 0013) eller vagthavende ørelæge på Køge Sygehus tlf. 5663 1500) mhp. behandling af blødningen. Opstår der feber og/eller forværring af smerter i dagene efter operationen kontaktes klinikken eller egen læge.

Når du kommer hjem må du drikke og spise – første døgn er det bedst med kold og blød kost.

Det er vigtigt, at du tager den ordinerede smertestillende medicin, og får spist og drukket godt når den virker – det kan gøre ondt i halsen op til 14 dage.

Kigger du dig i halsen efter operationen, vil du kunne se lidt små sår, der hvor mandlerne sad før. Der kommer belægninger på i løbet af de første dage. Disse belægninger er en del af helings-processen og kan give dårlig ånde.

Sårene heler op i løbet af 10-14 dage.

Smertestillende behandling efter operation

	Styrke	Morgen	Middag	Aften	Nat.
Dispergibel tablet Pamol Flash					
Tbl./stikpille Panodil					
Stikpille Voltaren					
Tbl. Ibumetin					