

Dræn.

Anlæggelse af dræn i trommehinden vælges ved:

- Gentagne mellemørebetændelser med belastende smerter.
- Længere varende væske i mellemøret med påvirket høreevne, tale og adfærd.


Næsten alle børn får på et eller andet tidspunkt mellemørebetændelse. De fleste slipper med få og kortvarige gener, men hos andre afløser den ene infektion den anden. I disse tilfælde når mellemørerne ikke at blive raske mellem sygdomsperioderne.

I sådanne tilfælde kan et dræn i trommehinden for en periode ”bryde den onde cirkel” børnene er havnet i.

Mange børn oplever trykkende fornemmelser i ørerne i forbindelse med forkølelser. Hos en del børn opstår der et snigende høretab på grund af vedvarende slimdannelse bag trommehinderne.

Disse børn taler senere og dårligere end andre, eller de begynder at råbe højere og bliver måske mere urolige end før. Mange, men ikke alle, plages af afbrudt søvn og ændret adfærd – de bliver ofte mere pirrelige og voldsomme.

Anlæggelse af dræn bevirker bedre ventilation af mellemørerne. Slimhinden i mellemørerne vil langsomt normaliseres således at slimdannelse aftager. Trommehinden vil efterhånden igen kunne svinge frit, og hørelsen dermed blive normal.



Før operationen

Mavesækken skal være tom før bedøvelsen. Det er farligt at bedøve børn med noget som helst i mavesækken derfor: Må man ikke spise de sidste 6 timer før operationen. Man må drikke vand og KUN VAND op til 2 timer før operationen. Ammemælk må gives senest 4 timer før operationen. Astmaspray benyttes som vanligt før operation

Operationen

Indgrebet foregår i fuld narkose givet på maske af klinikkens speciallæge i anæstesiologi. Indsovningen varer under 1 min. Drænet, der er få mm langt, placeres i et lille snit i trommehinden, efter at mellemøret er suget tomt for slim.



Efterforløbet

De første dage efter operationen kan det flyde fra øret med slim, pus eller blod. Flyder det mere end 7 dage, kan det være hensigtsmæssigt at ringe til klinikken, idet det i så fald kan blive nødvendigt at modtage behandling med øredråber. Senere i forløbet kan det måske begynde at flyde fra øret f.eks. i forbindelse med forkølelse. Når det skal til at flyde kan patienten have smerter, idet der skal opnås et vist tryk bag drænet før det begynder at flyde. Ved voldsomt øreflåd kan drænet desværre udstødes og genanlæggelse blive nødvendig.

Rensning ved øreflåd

Det er vigtigt, at rense ydre øre når patienten flyder, dette gøres bedst med Brintoverilte 3%. Beskyt huden med en god uparfumeret creme.

Kontrol

Nogen tid efter operationen skal barnet møde til kontrol af mellemøre og dræn. Herefter vil vi jævnligt følge ørerne indtil drænet er faldet ud af sig selv. Er mellemørerne herefter blevet raske er behandlingen slut. Kommer der øreproblemer igen kan det blive nødvendigt at lægge nye dræn eller evt. fjerne barnets ”polypper” – adenoide vegetationer.

Børn må gerne bade og svømme med dræn. Ved dykning kan der komme vand til mellemøret gennem drænet.