

# Tonsillotomi

(”delvis fjernelse af halsmandler”)




*Peter Tingsgaard Ph.d.  
Speciallæge i øre- næse- halssygdomme  
Korsgade 6, 1 4200 Slagelse  
Patienttlf.: 5853 3854  
Fax: 5850 3932  
[www.tingsgaard.dk](http://www.tingsgaard.dk)*

## Tonsillotomi

Tonsillotomi betyder delvis fjernelse af halsmandlerne. Operationen kommer på tale ved voldsomt forstørrede mandler der medfører spisebesvær, vejrtrækningsbesvær, snorken og pauser i vejrtrækningen under søvn hos børn. Operationen foregår i fuld bedøvelse givet af klinikkens speciallæge i anæstesiologi. Munden åbnes ved hjælp af en mundspærre, der trykker tungen ned.

Mandlerne deles med en el-kniv.



## Før operationen

Af sikkerhedshensyn skal mavesækken være tom ved operationen, dvs:

Man må ikke spise de sidste 6 timer før operationstidspunktet.

Der må drikkes lidt vand indtil 2 timer før operationen.

Astmaspray benyttes som vanligt før operation.

Børn skal ledsages af 2 voksne.

Der skal 2 timer før operationen gives smertestillende medicin.

### **Smertestillende 2 timer før operation**

<b>Stikpille Panodil á</b>	<b>mg</b>	<b>stk.</b>
<b>Disp. tbl. Pamol Flash á</b>	<b>mg</b>	<b>stk.</b>


## Efter operationen

Barnet vil blive observeret i klinikken, indtil tilstanden er stabil, og mundhulen er kontrolleret for blødning.

Efter operationen føles drøblen mere fyldig end normalt (vandig hævelse), og tungen tykkere end før (efter trykket fra mundspærre).

Senere på dagen kontakter vi jer telefonisk for at høre til barnets velbefindende.

Efter operationen skal barnet være hjemme resten af ugen.



*Kommer der frisk blødning fra halsen efter operationen, er det vigtigt at man uanset tidspunktet på døgnet kontakter vagthavende ørelæge på Køge Sygehus tlf. 5663 1500) mhp. behandling af blødningen. Opstår der feber og/eller forværring af smerter i dagene efter operationen kontaktes klinikken eller egen læge.*

Når I kommer hjem må barnet drikke og spise is, yoghurt o. lign. – senere på dagen, hvis der ikke har været problemer må barnet spise normalt. Første døgn er det dog bedst med kold og blød kost.

Det er vigtigt, at I bruger den ordinerede smertestillende medicin det første døgn.

### **Smertestillende behandling efter operation**

	Styrke	Morgen	Middag	Aften	Nat.
Dispergibel tablett Pamol Flash					
Tbl./stikpille Panodil					
Tbl./stikpille Voltaren					